



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Ing. Jana Ondráčková / 545 110 470

E-mail: jana.ondrackova@ukzuz.cz

Datum: 13. 1. 2015

č.j. : UKZUZ 002635/2015

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 12. 2014 – 31. 12. 2014

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Abrusta

držitel rozhodnutí o povolení: DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14/628, 155 00 Praha 5

evidenční číslo: 4883-0

účinná látka: penthiopyrad 150 g/l

cyprokonazol 60 g/l

platnost povolení končí dne: 31.5.2021

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice	padlí travní, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, rez pšeničná, rez plevová, helminthosporiíza pšenice	1,33 - 1,67 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 69 BBCH	
žito, tritikale	padlí travní, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, rynchosporiová skvrnitost, rez pšeničná, helminthosporiíza pšenice	1,33 - 1,67 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 69 BBCH	
ječmen	hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost, rez ječná, ramulariová skvrnitost ječmene	1,33 - 1,67 l/ha	AT	1) od: 31 BBCH, do: 69 BBCH	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
pšenice, žito, tritikale, ječmen	150 - 400 l/ha	postřik	max. 1x

Nižší dávka přípravku 1,33 l/ha je určena pro ošetření proti rzím; proti ostatním chorobám při nižším infekčním tlaku.

Použití v množitelských porostech pšenice jarní konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
obilniny	4	4	4	4

Buzzin 70 WG

držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), 400050 Mumbai, Indie

evidenční číslo: 5068-0

účinná látka: metribuzin 700 g/kg

platnost povolení končí dne: 30.9.2017

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
brambor	plevele lipnicovité jednoleté, plevle dvouděložné jednoleté	0,75 kg/ha	AT	1) preemergentně po poslední slepé proorávce 2) preemergentně	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
brambor	150 - 400 l/ha	postřik	max. 1x

Spektrum plevelů:

Plevle citlivé – lipnice roční, merlík bílý, rdesno červivec, rozrazil perský

Plevle méně citlivé – ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, opletka obecná

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Následné plodiny:

Před výsevem následných plodin musí být provedeno mechanické zpracování půdy (orba, kultivace) do hloubky min. 15 cm - co nejdříve po sklizni. Po sklizni plodiny v obvyklém termínu (kromě brambor, které jsou sklizené jako velmi rané nebo rané) lze jako následné plodiny vysévat ozimé obilniny. Po bramborách, které byly sklizené jako velmi rané nebo rané, lze po mechanické kultivaci vysévat hrách nebo mrkev.

Náhradní plodiny:

Při použití přípravku nelze po předčasné likvidaci porostu vyloučit poškození náhradní plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek nepoužívejte v množitelských porostech bramboru.

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3x) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně se asanuje 3% roztokem sody a propálá vodou.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
brambor	7	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
brambor	5	0	0	0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Custodia

držitel rozhodnutí o povolení: AGROVITA spol. s r.o., Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice
evidenční číslo: 5202-0

účinná látka: azoxystrobin 120 g/l

tebukonazol 200 g/l

platnost povolení končí dne: 31.8.2019

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
řepka olejka	hlízenka obecná	1 l/ha	AT	1) od 61 BBCH do 65 BBCH	

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka	200 - 400 l/ha	postřik	max. 1x

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jablek jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Důkladně vypláchněte obal.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
řepka olejka	4	4	4	4

Latitude XL

držitel rozhodnutí o povolení: Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, B-2040 Antverpy, Belgie

evidenční číslo: 4992-0

účinná látka: silthiofam 125 g/l

platnost povolení končí dne: 31.10.2016

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice, ječmen, tritikale, pšenice špalda	černání pat stébel	2 l/t osiva	AT		4) výsevek max. 200 kg /ha

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace
ječmen, pšenice, pšenice špalda, tritikale	4 l/t	moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Následné plodiny nesmí být sety/sázeny 9 měsíců po vysetí obilovin namořených přípravkem Latitude XL.

Momentum

držitel rozhodnutí o povolení: AGROVITA spol. s r.o., Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice

evidenční číslo: 4931-0

účinná látka: fosetyl - Al 500 g/kg

folpet 250 g/kg

platnost povolení končí dne: 30.4.2017

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
réva	plíseň réвовá	2 kg/ha do BBCH 61 4 kg/ha od BBCH 61	28	1) od: 14 BBCH, do: 81 BBCH	6) hrozny moštové

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
réva	200 - 1000 l/ha (max. 500 l/ha do BBCH 61)	postřik, rosení	max. 5x	10 - 12 dnů

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

MOMENTUM	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
réva	12	7	6	6

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m

Pistol Flex

držitel rozhodnutí o povolení: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, Francie

evidenční číslo: 5113-0

účinná látka: jodosulfuron-methyl sodný 10 g/kg

diflufenikan 360 g/kg

platnost povolení končí dne: 31.10.2016

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitečnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
nezemědělská půda (nezpevněné plochy), železnice	plevele jednoděložné, plevy dvouděložné	0,5 kg/ha	--	1) od března do června 2) časně postemergentně	

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
nezemědělská půda, železnice	300 - 500 l/ha	postřik	max. 1 x

Spektrum účinnosti:

plevele citlivé – lipnice roční, pcháč oset, draslavec hadincovitý, turanka kanadská, starčky, mléče, heřmánky, řebříček, kakost, vrbovky, jitrocele, rdesna, rozrazil

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Obzvláště citlivé jsou rostliny z čeledi růžovitých.

Čištění aplikačního zařízení:

- Vystříkejte všechnu postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku.
- Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry a dobře je propláchněte ve vodě.
- Naplňte postřikovač vodou na cca 20 % obsahu nádrže a spusťte míchání (doporučuje se rotační čistící tryska).
- Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku.
- Opakujte krok 3 a 4.
- Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny.

Přípravek je v praxi možné aplikovat pouze s ochranným herbicidním krytem učeným k redukci úletu.

Terpal

držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen,
Německo

evidenční číslo: 5222-0

účinná látka: ethefon 155 g/l

mepikvát chlorid 305 g/l

platnost povolení končí dne: 31.7.2017

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice ozimá, ječmen ozimý	zvýšení odolnosti proti poléhání	2 l/ha	AT	1) před dosažením BBCH 39	
pšenice ozimá, ječmen ozimý	zvýšení odolnosti proti poléhání	1,5 l/ha	AT	1) před dosažením BBCH 49	
pšenice ozimá	zvýšení odolnosti proti poléhání	2 l/ha	AT	1) před dosažením BBCH 39 - 1. aplikace, před dosažením BBCH 47 - 2. aplikace	4) 1. aplikace 1 - 1,5 l/ha + 2. aplikace 0,5 - 1 l/ha
ječmen ozimý	zvýšení odolnosti proti poléhání	2 l/ha	AT	1) před dosažením BBCH 39 - 1. aplikace, před dosažením BBCH 49 - 2. aplikace	4) 1. aplikace 1 - 1,5 l/ha + 2. aplikace 0,5 - 1 l/ha
tritikale	zvýšení odolnosti proti poléhání	2 l/ha	AT	1) před dosažením BBCH 39	
tritikale	zvýšení odolnosti proti poléhání	1,5 l/ha	AT	1) před dosažením BBCH 49	
ječmen jarní	zvýšení odolnosti proti poléhání	1,5 l/ha	AT	1) před dosažením BBCH 39	
ječmen jarní	zvýšení odolnosti proti poléhání	1 l/ha	AT	1) před dosažením BBCH 49	
žito ozimé	zvýšení odolnosti proti poléhání	2 l/ha	AT	1) před dosažením BBCH 39	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
ječmen, pšenice	100 - 400 l/ha	postřik	max. 1 x max. 2x dělená aplikace
tritikale, žito	100 - 400 l/ha	postřik	max. 1 x

Nepoužívejte slámu pocházející z ošetřených obilnin jako substrát pro kulturní rostliny, nebo jako mulč.

Neaplikujte na půdách s obsahem organické hmoty > 10 %.

Neaplikujte při teplotách nad 21 °C.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.

Pokyny pro čištění aplikační techniky:

1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).
2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).
3. Opakujte postup podle návodu "2" ještě jednou.
4. Trysky a sítko musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování

YAMATO

držitel rozhodnutí o povolení: Sumi Agro Europe Ltd., Vintners Place, 68 Upper Thames Street, EC4V 3BJ London, Velká Británie

evidenční číslo: 4930-0

účinná látka: thiofanát-methyl 233 g/l

tetrakonazol 70 g/l

platnost povolení končí dne: 31.10.2017

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice ozimá, žito, tritikale	braničnatka pšeničná, padlí travní	1,5 - 1,75 l/ha	AT	1) od: 37 BBCH, do: 47 BBCH	
řepka olejka	hlízenka obecná	1,5 - 1,75 l/ha	AT	1) od: 61 BBCH, do: 65 BBCH	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
pšenice, žito, tritikale, řepka olejka	200 - 400 l/ha	postřik	max. 1x

Vyšší dávku přípravku z uvedeného rozmezí použijte při předpokládaném vysokém infekčním tlaku.

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti braničnatce plevové a rzi pšeničné v pšenici ozimé, žitu a tritikale.

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na výnos a kvalitu výnosu žita a tritikale.

Nelze vyloučit snížení olejnatosti semene řepky.

Nelze vyloučit nepříznivý účinek ošetření pšenice ozimé, žita a tritikale na fermentační procesy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Vliv přípravku na klíčivost osiva žita a tritikale nebyl prověřen.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
pšenice ozimá, žito, tritikale, řepka olejka	6	4	4	4

Pro aplikaci do pšenice ozimé, žita, tritikale:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Pro aplikaci do řepky olejky:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Přípravek má sníženou vylévatelnost, a proto je nezbytné důkladné vypláchnutí aplikačního zařízení, aby nedocházelo k následné kontaminaci zbytky tohoto přípravku.

2. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO ÚŘEDNÍHO REGISTRU

- rozhodnutí nebyla vydána

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU

Banko 500 SC

držitel rozhodnutí o povolení: Arysta LifeScience S.A.S., Route d'Artix, P.B. 80, 64150
Nogueres, Francie

evidenční číslo: 5104-0

účinná látka: chlorthalonil 500 g/l

platnost povolení končí dne: 31.10.2017

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice ozimá	braničnatka plevová, braničnatka pšeničná	1 l/ha	60	1) od 31 BBCH, do 39 BBCH	
brambor	plíseň bramborová	2 l/ha	8	2) preventivně, podle signalizace	
rajče	plíseň bramborová, alternáiová skvrnitost	2 l/ha	3	2) preventivně, podle signalizace	5) pole

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
brambor, pšenice	200 - 400 l/ha	postřik	max. 1 x
rajče	600 - 800 l/ha	postřik	max. 1 x

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu nečlověkových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
pšenice ozimá	4	4	4	4
brambor, rajče	5	4	4	4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Maxim Star 025 FS

držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, Postfach, CH-4002 Basel, Švýcarsko

evidenční číslo: 4409-0

účinná látka: fludioxonyl 18,75 g/l

cyprokonazol 6,25 g/l

platnost povolení končí dne: 31.10.2018

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
ječmen jarní	hnědá skvrnitost ječmene, pruhovitost ječná, sněť prašná ječná, sněť ječná tvrdá, fuzariózy	1,5 l/t	AT		4) výsevek 150 - 200 kg/ha
ječmen ozimý	hnědá skvrnitost ječmene, sněť prašná ječná, sněť ječná tvrdá	1,5 l/t	AT		4) výsevek 130 - 200 kg/ha
ječmen ozimý	pruhovitost ječná, plíseň sněžná, fuzariózy	2 l/t	AT		4) výsevek 130 - 200 kg/ha

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace
ječmen	ječmen jarní 1,5 - 12 l/t ječmen ozimý 2 - 10 l/t	moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Přípravek lze použít s pomocným prostředkem CETM v souladu s návodem k použití.

Safari 50 WG (+ další obchodní jméno Trener)

držitel rozhodnutí o povolení: DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14/628, 155 00 Praha 5

evidenční číslo: 4025-0

účinná látka: triflusulfuron 486 g/kg

tj. 500 g/kg ve formě methyly

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2019

Rozsah použití přípravku:

1) rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitečnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová	plevele dvouděložné jednoleté	30 g/ha + 0,05 % Trend 90 - TM	AT	1) od: 10 BBCH, do: 39 BBCH 2) od: 10 BBCH, do: 12 BBCH	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová	100 - 500 l/ha	postřik	max. 4x	7 - 14 dnů

Safari 50 WG se aplikuje po vzejití řepy v intervalu růstových fází BBCH 10 – 39.

Citlivost odrůd salátové řepy konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Náhradní plodiny

V případě zaorávky lze po aplikaci přípravku Safari 50 WG vysévat opět cukrovku, po 30 dnech od poslední aplikace je možné vyset kukuřici.

Následné plodiny

Po sklizni cukrovky ošetřené přípravkem Safari 50 WG lze bez omezení pěstovat jakoukoli plodinu.

2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
čekanka salátová pouze pro kořeny k rychlení	plevele dvouděložné jednoleté	10 - 30 g/ha + 0,05 % Trend 90 - TM	AT	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
čekanka salátová pouze pro kořeny k rychlení	100 - 500 l /ha	postřik	max. 4x do celkové dávky 60 g/ha	7 - 14 dnů

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fyto toxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

3) Další společné pokyny pro použití přípravku:

Termín ošetření se řídí vývojovou fází plevelů. Safari 50 WG se aplikuje na vzešlé plevely od vytvoření děložních lístků až do fáze 2 pravých listů. Požadované účinnosti se dosáhne opakovanou aplikací na nově vzcházející plevely v dávce 30 g/ha + 0,05 % smáčedla TREND 90.

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevely

bažanka roční, drchnička rolní, heřmánkovité plevely, hluchavka nachová, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolek, konopice polní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík zvrhlý, mléč rolní, penízek rolní, pětour maloúborný, pryšec kolovratec, rdesno blešník, rdesno červivec, rozrazil rolní, rozrazil perský, ředkev ohnice, svízel přitula, tetlucha koží pysk, výdrol řepky a slunečnice.

Méně citlivé plevely

Mák vlčí, merlík bílý, psárka polní, ptačinec žabinec, rdesno ptačí, violka rolní.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Neošetřujte při teplotách vyšších než 25 °C.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, čekanka salátová pouze pro kořeny k rychlení	4	4	4	4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ DALŠÍHO PROSTŘEDKU**PodGUARD**

držitel rozhodnutí o povolení: SDP SAS, 2 Rue des Tilleuls, 02320 Pinon, Francie

evidenční číslo: 1762-0C

účinná látka: polyvinyl alkohol 208 g/l

platnost povolení končí dne: 20.5.2024

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
řepka olejka, brukvovité	omezení ztrát při sklizi	0,25 – 0,3 %	AT	1) od: 80 BBCH, do: 89 BBCH	

AT - jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka, brukvovité	100 - 150 l/ha	postřik	max. 1x

Optimální termín aplikace je ve fázi, kdy většina šešulí ztratila sytě zelenou barvu a změnila ji na světle zelenou (BBCH 81 - 83).

5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA V ROZŠÍŘENÉM POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)**a) rozhodnutí vydaná držiteli povolení k přípravku**

- rozhodnutí nebyla vydána

b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu ze zemědělského

Amistar Xtra

evidenční číslo: 4626-0

účinná látka: azoxystrobin 200 g/l

cyprokonazol 80 g/l

platnost povolení končí dne: 31.12.2015

Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
ostropestřec mariánský	houbové choroby	0,75 l/ha	AT	1) ve fázi butonizace	6) pro výživu zvířat

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
ostropestřec mariánský	200 - 300 l/ha	postřik	max. 1x

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
ostropestřec mariánský	4	4	4	4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.